

CINNARIZINE

75 mg Capsules

Description and Actions: Each Cinnarizine capsule for oral administration contains 75 mg cinnarizine.

Cinnarizine is a piperazine derivative with antihistamine, sedative, & calcium-channel blocking activity.

Cinnarizine has been shown to be a non-competitive antagonist of the smooth muscle contractions caused by various vasoactive agents. Cinnarizine also acts on vascular smooth muscle by selectively inhibiting the calcium influx into depolarized cells, thereby reducing the availability of free Ca^{2+} ions for the induction & maintenance of contraction. Cinnarizine therefore prevents the muscle cells contracting, resulting in widening of the blood vessels. This improves blood circulation in peripheral arterial diseases such as Raynaud's disease (where arteries in the extremities are narrowed). It relieves the pain associated with these diseases by increasing the flow of blood & oxygen to the tissues in the extremities (hands, feet). Cinnarizine inhibits stimulation of the vestibular center.

Indications: Symptomatic treatment of nausea, vertigo, dizziness, and tinnitus (buzzing or ringing in the ears) caused by Ménière's disease and other vestibular disorders

- Migraine prophylaxis - Prevention and treatment of motion sickness
- Management of various peripheral vascular disorders; Raynaud's phenomenon, intermittent claudication, acrocyanosis (persistent blue discoloration of the skin), trophic disturbances, trophic and varicose ulcers, paraesthesia, nocturnal cramps, cold extremities
- Management of cerebrovascular disorders including dizziness, tinnitus, vascular headache, unsociability & irritability disorders, loss of memory and lack of concentration

Dosage and Administration: Dosage and duration of treatment are individualized & adjusted according to the condition under treatment.

Cinnarizine should preferably be taken after meals. The usual recommended doses are:

Indications:	Dose
Vertigo and vestibular disorders	75 mg (1 capsule) once or twice daily
Cerebrovascular disorders	75 mg (1 capsule) 1 to 3 times daily
Peripheral vascular disorders	75 mg (1 capsule) 2 or 3 times daily

The maximum recommended dosage should not exceed 225 mg (3 capsules of 75 mg) daily.

In case of overdose: In case of intake of high doses of this medication, inform your doctor at once and seek emergency medical attention. General measures should be adopted.

In case of missed dose: If you miss a dose, skip the missed dose and continue your regular dosing schedule. Do not take a double dose to make up for a missed one.

Contraindications: This drug is contraindicated in case of history of hypersensitivity to any of the components.

Precautions: In patients with Parkinson's disease, this drug should only be given if advantages outweigh the possible risk of aggravating this disease.

This drug must be used with caution in elderly patients and in patients with hypotension, porphyria, hepatic or renal impairment. Caution should be taken when driving a car or operating machinery since drowsiness may occur especially at the start of treatment.

Inform your doctor before using this medication in case of pregnancy or lactation. It is recommended to avoid using this medication during pregnancy or lactation.

Associations with other medications: Please inform your doctor if other medicines are being taken or have been taken recently. This drug may enhance the sedative effect of central nervous system depressants including alcohol, barbiturates, hypnotics, narcotic analgesics, tricyclic antidepressants, sedatives & tranquilizers.

Adverse reactions: The most reported adverse reactions include drowsiness and gastrointestinal disturbances (such as diarrhea, constipation, nausea vomiting or abdominal pain). These are usually transient. Rarely reported adverse reactions include fatigue, headache, dry mouth, perspiration, weight gain, extrapyramidal symptoms, hypersensitivity reactions, and jaundice.

Inform your doctor if any side effect appears or becomes bothersome.

Storage: Store below 25°C protected from light and humidity.

Pack Presentation: Cinnarizine 75 mg, pack of 20 capsules.

Revision date 09/2007.

THIS IS A MEDICAMENT

- A medicament is a product which affects your health, & its consumption contrary to instructions is dangerous for you
 - Follow strictly the doctor's prescription, the method of use & the instructions of the pharmacist who sold the medicament
 - The doctor and the pharmacist are experts in medicine, its benefits and risks.
 - Do not by yourself interrupt the period of treatment prescribed for you
 - Do not repeat the same prescription without consulting your doctor
- Keep out of the reach and sight of children.

سناريزين

المواصفات والمفاعيل: تحتوي كل كبسولة على ٧٥ ملغ سناريزين. إن كبسولات سناريزين هي للاستعمال الفموي، سناريزين هو من مشتقات البيبيرازين ، له مفعول مضاد للهستامين، مسكن، ومضاد لكالسيوم. يعمل سناريزين على إغلاق مرعات الكالسيوم ، وبالتالي يمنع الكالسيوم من الدخول إلى الخلية مما يؤدي إلى استرخاء الخلية وتوسع الأوعية الدموية . إن توسع الأوعية الدموية يحسن دوران الدم ووصول الأوكسجين إلى الأنسجة الطرفية (اليدين والرجلين) مما يؤدي إلى زوال عوارض أمراض الشرايين المحيطية مثل داء زينر. كذلك يمنع سناريزين إثارة المركز الحظري **دواعي الإستعمال:** علاج عوارض الغثيان ، الدوار، والطنين من جراء داء مينير أو اضطرابات دهليزية أخرى

الوقاية من الشقيقة، الرقالية وعلاج دوار الحركة

علاج اضطرابات الأوعية المحيطية: داء رينو ، العرج المنقطع ، ازرقاق الأطراف اضطرابات تغذية الأنسجة، القرحة الاعتدانية والدالية، التصلب المعص العضلي الليلي، الأطراف الباردة

علاج الاضطرابات المخية الوعائية منها الدوار، الطنين، الصداع الوعائي، اضطرابات عدم الألفية والاستثارية، فقدان الذاكرة ، وقلة التركيز **الجرعة:** ينصح بتناول كبسولات سناريزين بعد الطعام، الجرعات المعتمدة عند الكبار هي .

الجرعة

دواعي الاستعمال

الدوار والاضطرابات الدهليزية
الاضطرابات المخية الوعائية
اضطرابات الأوعية المحيطية

٧٥ ملغ (كبسولة واحدة) مرة أو مرتين في اليوم

٧٥ ملغ (كبسولة واحدة) مرة واحدة إلى ٣ مرات في اليوم

٧٥ ملغ (كبسولة واحدة) مرتين إلى ٣ مرات في اليوم

لا يجب ان تتجاوز الجرعة المعتمدة ٢٢٥ ملغ (٣ كبسولات من ٧٥ ملغ) في اليوم.

في حال الإفراط في الجرعة: إذا تناولت جرعات اضافية من هذا الدواء أعلم طبيبك ليتم العلاج وفقا للأعراض.

في حال نسيان تناول الدواء: إذا نسيت ان تتناول الدواء في الوقت المحدد، اترك الجرعة النسيية وتلق العلاج بالجرعة المعتمدة. لا تتناول جرعة مضاعفة في الوقت نفسه.

موانع الاستعمال: لا يجب استعمال هذا الدواء في حالات الحس المفرط لأي من المكونات .

الاحتياطات الواجب اتخاذها عند تناول هذا الدواء: لا يجب استعمال هذا الدواء عند المرضى المصابين بداء باركنسون إلا عند الضرورة القصوى

يجب توخي الحذر عند استعمال هذا الدواء عند المرضى المسنين وفي حالات نقص ضغط الدم، البرفيرية ، قصور الكبد أو الكلى .

يجب توخي الحذر عند قيادة السيارة أو استعمال آلات خطيرة بسبب التفاعل الذي قد يسببه هذا الدواء خاصة في الأيام الأولى من العلاج .

يجب استشارة الطبيب قبل استعمال هذا الدواء أثناء الحمل والرضاعة. ينصح بتجنب تناول هذا الدواء أثناء الحمل والرضاعة.

استعمال سناريزين مع غيره من الأدوية: يستحسن إعلام الطبيب أو الصيدلي عن الأدوية التي تستعملها. يمكن لهذا الدواء ان يزيد المفعول المسكن

لمنبطات الجهاز العصبي المركزي مثل الكحول البربيوتورات، المنومات، المسكنات المخدرة، مضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقة، المسكنات والمهدئات.

التأثيرات الجانبية: من العوارض الجانبية الأكثر حدوثاً: نعاس، اضطرابات في الجهاز المعدي المعوي (إسهال، اسهال، غثيان

تقيؤ ألم في البطن) . إن معظم هذه العوارض تكون عابرة .

نادراً ما يمكن ان يحصل تعب، صداع، جفاف الفم ، ترقق، زيادة في الوزن ، عوارض مشابهة لداء باركنسون ، عوارض تحسسية ويريقان

أعلم طبيبك في حال حصول اي عوارض جانبية أو انزعاجك منها.

طريقة الحفظ: يحتفظ بعيداً عن الضوء وعن الرطوبة في حرارة لا تتعدى 25° C درجة مئوية

العيوه: سناريزين ٧٥ ملغ علبة من 20 كبسولة

إن هذا الدواء

- الدواء مستحضر يؤثر على صحتك وإستهلاكه خلافاً للتعليمات يعرضك للخطر .
- إتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الإستعمال المنصوص عليها وتعليمات الصيدلاني الذي صرفها لك .
- فالطبيب والصيدلاني هما الخبيران بالدواء وبنفعه وضرره .
- لا تقطع مدة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك .
- لا تكرر صرف الدواء بدون وصفة طبية .

إحفظ الدواء بعيداً عن متناول الأطفال

